



JIO FEED

CATTLE | LAYER | PELLET FEED



GF

GREENFEED
INDUSTRIES



पशु, पंक्षी एवम् कुरुराको लागि सर्वोत्तम आहार
जियो फिडको आधुनिक पोषिलो आहार

जियो फिडको गुणस्तरीय आहार ब्यवसाय वृद्धिको राम्रो आधार

जियो फिडले पशु, पंक्षी व्यवसायीको लागि आफ्नो लामो अनुभव एवम् अनुसन्धानद्वारा आधुनिक प्रविधिबाट उत्पादित गुणस्तरीय आहार ल्याएको छ । यसको प्रयोगले पशु, पंक्षी व्यवसायमा तुलनात्मक रूपमा वृद्धि एवम् सुधार ल्याउनुका साथै पशु, पंक्षी व्यवसायीको आर्थिक स्थितीमा पनि वृद्धि गर्दै लैजान्छ । जियो फिडको आहारमा कुनै पनि प्रकारको विषादी एवम् रसायन प्रयोग नभएकोले पशु एवम् पंक्षीको स्वास्थ्यमा पनि सुधार ल्याउँदै उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गर्दछ । त्यसैले आजै देखि आफ्नो व्यवसायलाई वृद्धि गर्न जियो फिड ब्राण्डका आहारहरूको प्रयोग गरौं ।



GF

GREENFEED
INDUSTRIES

Green Feed Industries Pvt. Ltd.

Lalbhitti, Dhalkewar, Nepal

Tel. : +977-9854028990



- जियो पशु आहार गाई, भैंसी एवम् बाछा-बाछीका लागि सर्वोत्तम आहार हो ।
- यस आहारले गाई, भैंसीको दुधको गुणस्तरमा वृद्धि गराई दुध उत्पादनलाई वृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ ।
- जियो पशु आहारले पशुहरूको स्वास्थ्यको विकास गर्दछ ।
- यस पशु आहार युरिया एवम् विषदी रहित भएकोले पशु स्वास्थ्यमा सुधार गरि दुध उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गर्दछ साथै पशुको प्रजनन क्षमतामा पनि वृद्धि गर्दै लैजान्छ ।

त्यसैले पशुलाई जियो फिडको पशु आहार नै खुवाउँदा र पशुको स्वास्थ्य एवम् दुध उत्पादनमा वृद्धि गराउँदा

अण्डा उत्पादनका लागि पालिने कुखुराको सर्वोत्तम आहार



अण्डा उत्पादनको निम्ती कुखुरालाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ तथा भिटामिन एवम् मिनरलको समिश्रणबाट तयार गरिएको आहार हो जियो लेयर्स पेलेट दाना । यसको प्रयोगले कुखुराको उण्डा उत्पादन क्षमतामा विकास गर्नुका साथै कुखुरालाई पनि स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ ।

- L-1 सुरुदेखि ८ हप्तासम्म खुवाउने
- L-2 ९ देखि १७ हप्तासम्म खुवाउने
- L-3 १७औं हप्तापछि खुवाउने

मासु उत्पादनका लागि पालिने कुखुराको सर्वोत्तम आहार



उच्च गुणस्तरको कच्चा पदार्थ तथा भिटामिन एवम् मिनरलको समिश्रणबाट तयार गरिएको कुखुराको आहार, जसको प्रयोगले कुखुराको वजनमा छिटो वृद्धि गराउँदछ । यस जियो फिडद्वारा उत्पादित पेलेट दानाको आकार सबै एकै प्रकारको हुन्छ ।

- B-0 एक दिन देखि १४ दिनसम्मको चल्लाको लागि
- B-1 १४ दिन देखि ३० दिनसम्मको कुखुराको लागि
- B-2 ३० दिन देखि ४५ दिनसम्मको कुखुराको लागि
- B-3 त्यसपछि आवश्यकता परेमा